

Hvor ofte skal du ormebehandle din HUND?

Hund lever indendørs

Hunden lever udelukkende indendørs eller har meget begrænset adgang til udendørsområder, hvilket betyder, at den ikke har direkte kontakt med andre hunde og ikke har adgang til parker eller haver. Hunden får ikke rått kød og/eller spiser ikke snegle, dræbersnegle eller byttedyr.

Hunden har regelmæssig adgang til udendørsområder

Hunden kommer ofte udenfor, kan som regel bevæge sig frit uden opsyn og har direkte kontakt med andre hunde. Hunden viser jagtadfærd og/eller har en øget tendens til at spise byttedyr, slagteraffald eller får rått kød som foder.

Hunden har en tendens til at spise snegle eller komme i kontakt med snegle og/eller spiser græs.

Gruppe A

Ormebehandl 1-2 gange om året mod spolorm, eller basér behandlingen på resultatet af en afføringsprøve.

Gruppe B

Ormebehandl 4 gange om året mod spolorm, eller basér behandlingen på resultatet af en afføringsprøve.

Gruppe C

Behandl 4-12 gange om året mod spolorm og lungeorm, eller basér behandlingen på resultatet af en afføringsprøve.

Behandl 4-12 gange om året mod bændelorm.

Gruppe D

Behandl 4-12 gange om året mod spolorm og lungeorm, eller basér behandlingen på resultatet af en afføringsprøve.

Behandl 12 gange om året mod bændelorm.

Forebyggende tiltag

- Hvis der ses stykker af bændelorm omkring endetarmen eller i afføringen, skal hunden også ormebehandles mod bændelorm med praziquantel og samtidig påbegyndes en loppebehandling.
- At få din hunds afføring undersøgt regelmæssigt er et godt alternativ til den "standard" ormebehandlingsanbefaling.
- **Vigtige hygiejnetiltag for mennesker og dyr:**
 - 1: Vask hænderne grundigt (især hos børn), især før du spiser.
 - 2: Vask frugt og grøntsager grundigt, før de spises.
 - 3: Giv ikke rått kød som foder. Sørg altid for frisk drikkevand.
 - 4: Dæk sandkasser til, når de ikke er i brug.
 - 5: Saml hundens afføring op med det samme – i haven eller på gåturen – og smid det i skraldespanden til restaffald. Ikke på kompostbunken! Vask hænderne bagefter.

Supplerende behandling

Behandling mod spolorm:

- Hvalpe skal ormebehandles fra en alder af 2 uger, og behandlingen gentages hver 2. uge indtil 2 uger efter fravænning. Hvis der er en vedvarende øget risiko for infektion (for eksempel i hvalpelegegrupper), anbefales månedlige behandlinger indtil seks måneders alderen.
- Ormebehandl en diegivende tæve samtidig med den første behandling af hvalpene (2 uger efter fødslen).
- For at reducere overførsel til hvalpene kan drægtige tæver omkring dag 40 og 55 i drægtigheden få makrocycliske laktoner (for eksempel Milbemycin) eller dagligt fenbendazol fra dag 40 i drægtigheden til den 2. dag efter fødslen.
- Hunde med øget infektionsrisiko (sport, udstilling, konkurrence, kennel) bør behandles to gange, højst 2 uger før og 2 uger efter begivenheden. I kenneler anbefales månedlig ormebehandling eller behandling baseret på resultatet af en månedlig afføringsprøve.
- Arbejds-hunde (terapi-, rednings- og politihunde) bør, afhængigt af valgdiagrammet, ormebehandles månedligt eller – når eksponeringen for rævens bændelorm er lav – behandles baseret på resultatet af en månedlig afføringsprøve.

- Hunde, der lever sammen med små børn (under 5–6 år), immunkompromitterede eller ældre personer (YOPI'er), bør ifølge valgdiagrammet ormebehandles månedligt eller få taget en månedlig afføringsprøve og behandles ud fra resultatet.

Behandling mod lungeorm/fransk hjerteorm

- Hunde, der har tendens til at spise snegle og/eller dræbersnegle samt græs, bør ifølge valgdiagrammet – for eksempel baseret på hyppigheden af optagelse af snegle/dræbersnegle og graden af smitte i området – behandles forebyggende hver måned.

Behandling mod bændelorm:

- Hunde, der rejser til eller importeres fra områder, hvor rævens bændelorm forekommer, skal behandles 4 uger efter rejsens start og derefter månedligt indtil 4 uger efter hjemkomsten. Efter import bør der ormebehandles med det samme.

- For hunde, der spiser rått kød, slagteraffald eller byttedyr, eller som jager, anbefales det at ormebehandle hver 4. uge eller basere behandlingen på resultatet af en afføringsprøve hver 2.-3. måned.

- Ormebehandl ved loppeangreb.

- Ormebehandl, hvis der påvises en bændelorminfektion.

Behandling mod hjerteorm:

- Hunde, der lever i områder, hvor hjerteorm findes, bør få forebyggende behandling mod larver hver måned i myggesæsonen og fortsætte behandlingen op til 30 dage efter myggesæsonens afslutning.

Rejser og transport:

- Hunde, der rejser til eller importeres fra områder med hjerteorm, bør behandles senest 30 dage efter afrejse og derefter månedligt indtil 30 dage efter hjemkomst.
- I myggesæsonen bør behandlingen påbegyndes inden for 30 dage efter ankomst og derefter fortsættes månedligt indtil 30 dage efter hjemkomst.
- Import fra områder med hjerteorm: Behandl straks efter import. Test for hjerteorm ved indførsel og gentest efter 6 måneder.

Ønsker du mere information fra vores dyrlæge om ormebehandling af din hund eller kat, så besøg www.medpets.dk/ormebehandling



Forklaring af forskellige typer orm

Orme er parasitter, der kan leve forskellige steder i dyrets krop. Hunde og katte kan blive smittet med orm i alle aldre – endda med ormetyper, der kan udgøre en risiko for mennesker. Nogle af de vigtigste typer orm er spolorm, hageorm og bændelorm, hvor de voksne orm lever i tyndtarmen; hjerteorm, som lever i lungernes blodkar; og den franske hjerteorm (eller lungeorm), hvor de voksne orm lever i blodkarrene mellem hjertet og lungerne. Nogle ormetyper kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker.

Spolorm

Spolorm er de mest almindelige orm hos hunde og katte og tilhører gruppen af rundorme. De kaldes sådan, fordi de er runde i tværsnit. De findes i tarmene, luftvejene, under huden, på øjnene, i næsens bihuler og i hjertets store blodkar. De mest almindelige og betydningsfulde rundorme i Danmark er hundens spolorm (*Toxocara canis*) og kattens spolorm (*Toxocara cati*).

Hjerteorm

Hjerteorm er den almindelige betegnelse for den parasitiske orm *Dirofilaria immitis*, som kan inficere både hunde og katte. Denne orm har fået sit navn, fordi den lever i hjertets og lungernes blodkar. I Danmark forekommer infektioner med denne ormetype endnu ikke, men den kan påvises hos dyr, der for eksempel stammer fra Sydeuropa eller har været med på ferie i dette område.

Bændelorm

Bændelorm har en indirekte livscyklus. De voksne bændelorm lever i tarmene hos slutværten (for eksempel hunden eller katten), mens de umodne stadier af bændelormen (kaldet blæreorm på grund af deres form) lever i andre dyrearter – de såkaldte mellemværter (for eksempel får, lopper, kaniner eller mus). Hunden bliver smittet, når den spiser mellemværten eller dele af den, hvorefter blæreormen trænger ind i hundens mave-tarmkanal og udvikler sig til en voksen bændelorm. Hos slutværten forårsager bændelorm næsten aldrig problemer.

Fransk hjerteorm (lungeorm)

Den franske hjerteorm er navnet på den parasitiske orm *Angiostrongylus vasorum*, som kan inficere hunde. Ormen har fået sit navn, fordi den lever tæt på hjertet i lungernes blodkar. Den kaldes også lungeorm, da en infektion kan føre til alvorlige lungeskader. Denne parasit findes i Danmark. Hunde bliver som regel smittet ved at spise snegle, men de kan også blive smittet ved at spise byttedyr.

Lungeorm

Ud over den franske hjerteorm findes der også en egentlig lungeorm hos hunde, nemlig *Oslerus osleri*. Denne parasit danner knuder i hundens større luftveje og kan give symptomer som tør hoste, hoste ved fysisk anstrengelse eller ved temperaturudsving samt åndenød, vægttab og nedsat appetit hos unge hunde. Hunde smittes ved at spise afføring fra inficerede hunde.

Ønsker du mere information fra vores dyrlæge om ormebehandling af din hund eller kat, så besøg www.medpets.dk/ormebehandling

